



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL / UFRJ-HCE
2022-2023

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA DE ENFERMAGEM

RECURSO – QUESTÃO 33 – ENFERMAGEM

33. Sobre os reflexos primitivos do recém-nascido pode-se afirmar que o reflexo:

- a) de Moro deve existir até a criança completar o 8º mês de vida;
- b) de engatinhar desaparece em cerca de seis semanas de idade;
- c) tônico-cervical deve desaparecer até o 6º mês de vida;
- d) de Galant desaparece no 2º mês de vida.

CANDIDATO(A): Fabio Machado Araujo

De acordo com o caderno de atenção básica 33 do ministério da saúde o engatinhar se inicia entre 6 e 9 meses não sendo possível desaparecer em cerca de 6 semanas de idade, trecho do caderno: "Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, engatinha". O reflexo de Galant, como indicado no caderno 33 deve ser realizado com 1 mês de vida, realizando o tônus e desaparece com 2 meses de vida: "Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e preensão reflexa".

CANDIDATO(A): Ariadney Ribeiro Brandão

Recurso da questão 33 caderno de enfermagem De acordo com o caderno de atenção básica 33 do ministério da saúde o engatinhar se inicia entre 6 e 9 meses não sendo possível desaparecer em cerca de 6 semanas de idade, trecho do caderno: "Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, engatinha". O reflexo de Galant, como indicado no caderno 33 deve ser realizado com 1 mês de vida, realizando o tônus e desaparece com 2 meses de vida: "Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e preensão reflexa".

CANDIDATO(A): TIELE MORGANA RISTOFF

Solicito mudança da resposta da alternativa b para a alternativa d. Sobre reflexos primitivos do recém-nascido: A)moro deve existir ate os 8 meses. ERRADO. O comportamento compreende estender os braços, pernas e dedos, curvar-se, jogar a cabeça para trás (abraço).A cessação se dá por volta dos 6 meses. B)engatinhar desaparece com 6 semanas de idade ERRADO. Conhecido como reflexo de LANDAU, Reflexo de Landau I: Trata-se do resultado de uma complexa interação de reações labirínticas e tônico-cervicais. Comportamento: ocorre espontaneamente a movimentação da cabeça, suspendendo ou estendendo-a juntamente com a extensão das pernas. Começa a evidenciar-se a partir dos 3meses. Cessa depois dos 12 meses. Reflexo Landau II: Comportamento: flexão das pernas. Aparece aos 3 meses e desaparece ao longo do 2 Ano. C)onico-cervical desaparece ate 6 mes de vida. ERRADO. Comportamento – o bebê assume a posição de esgrimista. A cessação se dá por volta dos 3 meses. D)galant desaparece no 2 mes de vida. CORRETA. Comportamento – a criança forma com o corpo um arco, apresentando a concavidade voltada na direção do estímulo, e a bacia é puxada para cima. A perna e o braço do mesmo lado estendem-se, as extremidades opostas fletem-se. Cessação se dá por volta dos 2 meses

CANDIDATO(A): Rafaela Lima de Oliveira

Recurso da questão 33 caderno de enfermagem De acordo com o caderno de atenção básica 33, PÁGINA 123, do ministério da saúde o engatinhar se inicia entre 6 e 9 meses não sendo possível desaparecer em cerca de 6 semanas de idade, trecho do caderno: "Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, engatinha". O reflexo de Galant, como indicado no caderno 33 deve ser realizado com 1 mês de vida, realizando o tônus e desaparece com 2 meses de vida: "Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e preensão reflexa".

Resposta ao recurso:

O reflexo de Moro desaparece após 3 ou 4 meses, normalmente mais forte durante os primeiros 2 meses.

Referência: Hockenberry MJ, Wilson D. Wong. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Página 202

Reflexo de engatinhar: Quando colocado em decúbito ventral, o recém-nascido faz movimentos de engatinhar com os braços e pernas; desaparece em cerca de 6 semanas de idade. Referência: Hockenberry MJ, Wilson D. Wong. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Página 203

O reflexo tônico-cervical desaparece entre 3 a 4 meses para ser substituído pelo posicionamento simétrico de ambos os lados do corpo. Referência: Hockenberry MJ, Wilson D. Wong. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Página 203

O reflexo do encurvamento do tronco (Galant) desaparece em até 4 semanas de idade. Referência: Hockenberry MJ, Wilson D. Wong. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Página 203

O gabarito da questão é a letra B.

RECURSO INDEFERIDO